PERÚ | MINISTERIO DE SALUD | HOSPITAL REGIONAL "JAMO II-2 DE TUMBES | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIELTAL

## Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

# Sala Situacional de Salud

Semana Epidemiológica N° 33 – 2026
(Del 16 al 22 de Agosto)



IRA

DENGUE

OTRAS ENFERMEDADES

## CD. IRINEO MIKE SERPA SOCUALAYA

Director Ejecutivo – Hospital Regional "JAMO II-2 de Tumbes"

## EQUIPO TÉCNICO DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL



**Lic. Enf. KARINA GARRIAZO PUSCÁN**

Jefa(e) de la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental y responsable de IAAS.

**Diseñado y Analizado por:**

**PTCI. ENRIQUE PÉREZ PEREYRA**

Responsable de Notificación, Procesamiento y Análisis Estadístico.

**Lic. Enf. IRIS YOLANDA CASTILLO BECERRA**

Responsable de Mortalidad Materna y Perinatal y enfermedades no Transmisibles

**Lic. Enf. SILVIA GALLEGOS HIGINIO**

Responsable de enfermedades Transmisibles

**Ing. PAÚL FRANCISCO AREVALO OLAYA**

Responsable de Salud Ambiental

# ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS – EDA(s)

**Gráfico N° 01: Frecuencia de Casos de Enfermedades Diarreicas Agudas, segun años 2019-2025 y hasta S.E. 33-2026**




**Gráfico N° 02: Frecuencia de Casos de Enfermedades Diarreicas Agudas, según grupo etareo. Hasta la S.E. 33 - 2026**




**Gráfico N° 03: Frecuencia de Casos de Enfermedades Diarreicas Agudas, según procedencia. Hasta S.E. 33 - 2026**




**Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacio**
**Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ar**
**Hasta la S.E 33 del 2026**

# ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS – EDA(s)

**Gráfico N° 04: Canal Endémico de las Enfermedades Diarreicas Agudas - EDA(s) Total, hasta Semana Epidemiológica 33 - 2026**




Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades MINSA
Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental – Hospital Regional "JAMO II-2 de Tumbes"
Hasta la S.E 33 del 2026

# INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS, NEUMONIA Y SOB/ASMA

**Gráfico N° 05: Frecuencia de Casos de IRA(s) < 5 años, según años 2019-2025 y hasta la S.E. 33 - 2026**




**Gráfico N° 06: Frecuencia de casos de IRA(s), segun rangos de edad. Hasta la S.E. 33 - 2026**




**Gráfico N° 07: Frecuencia de casos de Neumonias, segun rangos de edad. Hasta la S.E. 33 - 2026**




**Gráfico N° 08: Frecuencia de casos de SOB/Asma, segun rangos de edad. Hasta la S.E. 33 - 2026**




**Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades MINSA**
**Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental – Hospital Regional "JAMO II-2 de Tumbes"**
**Hasta la S.E 33 del 2026**

# INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS – IRA(s)

**Gráfico N° 09: Frecuencia de casos Fallecidos de Neumonias, segun rangos de edad. Hasta la S.E. 33 - 2026**




**Gráfico N° 10: Frecuencia de Casos IRA(s) < 5 años, según procedencia. Hasta S.E. 33 - 2026**




**Gráfico N° 11: Canal Endémico Infecciones Respiratorias Agudas - IRAS(s) < 5 Años, Hasta S.E 33 - 2026**




Fuent
Elabo
Hasta

# FEBRILES

**Gráfico N° 12: Frecuencia de casos de Febriles, segun años 2019-2025. Hasta la S.E. 33 - 2026**




**Gráfico N° 13: Frecuencia de casos febriles, según grupos de edad. Hasta S.E. 33 - 2026**




**Gráfico N° 14: Frecuencia de casos de Febriles, según procedencia. Hasta S.E. 33 - 2026**




**Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de**
**Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambienta**
**Hasta la S.E 33 del 2026**

# FEBRILES




**Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades MINSA**
**Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental – Hospital Regional "JAMO II-2 de Tumbes"**
**Hasta la S.E 33 del 2026**

# CASOS DE DENGUE – HOSPITAL REGIONAL "JAMO II-2"

| Total Confirmados | Total Probables | Total Negativos | Pruebas Realizadas | Total Fallecidos | Letalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 23 | 188 | 242 | 0 | 0.0 |

| Distritos | Casos (+) |
|---|---|
| Tumbes | 12 |
| Corrales | 9 |
| La Cruz | 3 |
| San Jacinto | 2 |
| Zorritos | 1 |
| Papayal | 1 |
| Aguas Verdes | 1 |
| Zarumilla | 1 |
| San Juan de la Virgen | 1 |
| Pampas de Hospital | 0 |
| Matapalo | 0 |
| Canoas de Punta Sal | 0 |
| Casitas | 0 |




Gráfico N° 16: Proporción de casos confirmados de dengue, según sexo. Hasta S.E 33 - 2026




Gráfico N° 17: Frecuencia por etapas de vida de casos confirmados de dengue, según sexo. Hasta S.E 33 - 2026




Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades MINSA
Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental – Hospital Regional "JAMO II-2 de Tumbes"
Hasta la S.E 33 del 2026

# CASOS DE DENGUE – HOSPITAL REGIONAL "JAMO II-2"

**Tabla N° 01: Características sociodemográficas y epidemiológicas de los casos clínicos de Dengue confirmados, hasta S.E 33 - 2026.**

| Características | n = 31 | % |
|---|---|---|
| **Edad *** | | |
| Media (± Desviación Estándar) | 22.00 | 5.68 |
| Mínimo (Máximo) | 2 años | 77 años |
| **Sexo** | | |
| Femenino | 17 | 54.8% |
| Masculino | 14 | 45.2% |
| **Habitad** | | |
| Urbana | 17 | 54.8% |
| Urbana Marginal | 3 | 9.7% |
| Rural Campesina | 11 | 35.5% |
| **Distribución por etapas de vida** | | |
| Neonato | - | - |
| < 1 año | 1 | 3.2% |
| Niño (1 a 11 años) | 11 | 35.5% |
| Adolescente (12 a 17 años) | 2 | 6.5% |
| Joven (18 a 29 años) | 12 | 38.7% |
| Adulto (30 a 59 años) | 2 | 6.5% |
| Adulto Mayor (≥ de 60 años) | 3 | 9.7% |
| **Clasificación según origen de la infección** | | |
| Autóctono | 31 | 100.0% |
| Importado | - | - |
| **Clasificación según forma clínica** | | |
| Sin señales de alarma | 12 | 38.7% |
| Con señales de alarma | 18 | 58.1% |
| Grave | 1 | 3.2% |

**Gráfico N° 18: Frecuencia de casos confimados de dengue. Desde la semana epidemiológica. Hasta la S.E. 33 - 2026**




**Gráfico N° 19: Frecuencia de casos de dengue confirmados. Hasta Agosto 2026**




**Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología, Preve**
**Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental – Hospital Regiona**
**Hasta la S.E 33 del 2026**

# CASOS DE LEPTOSPIROSIS

| Total Confirmados | Total Probables | Total Negativos | Pruebas Realizadas | Total Fallecidos | Letalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 41 | 05 | 99 | 1 | 1.89 |

| Distritos | Casos (+) |
|---|---|
| Tumbes | 39 |
| Corrales | 2 |
| San Juan de la Virgen | 2 |
| Zarumilla | 2 |
| San Jacinto | 2 |
| Zorritos | 2 |
| Matapalo | 1 |
| Casitas | 1 |
| Canoas de Punta Sal | 1 |
| Aguas Verdes | 0 |
| Papayal | 0 |
| Pampas de Hospital | 0 |
| La Cruz | 0 |

| | |
|---|---|
| Otras Regiones | 1 |




Gráfico N° 20: Proporción de casos confirmados de leptospirosis, según sexo. Hasta S.E 33 - 2026

Gráfico N° 21: Frecuencia por etapas de vida de casos confirmados de leptospir., según sexo. Hasta S.E 33 - 2026




Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades MINSA
Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental – Hospital Regional "JAMO II-2 de Tumbes"
Hasta la S.E 33 del 2026

# CASOS DE LEPTOSPIROSIS

**Tabla N° 02: Características sociodemográficas y epidemiológicas de los casos clínicos de Leptospirosis confirmados, hasta S.E 33 - 2026.**

| Características | n = 53 | % |
|---|---|---|
| **Edad *** | | |
| Media (± Desviación Estándar) | 37.58 | 10.75 |
| Mínimo (Máximo) | 2 años | 92 años |
| **Sexo** | | |
| Femenino | 38 | 71.7% |
| Masculino | 15 | 28.3% |
| **Habitad** | | |
| Urbana | 42 | 79.2% |
| Urbana Marginal | 6 | 11.3% |
| Rural Campesina | 5 | 9.4% |
| **Distribución por etapas de vida** | | |
| Neonato | - | - |
| < 1 año | - | - |
| Niño (1 a 11 años) | 7 | 13.2% |
| Adolescente (12 a 17 años) | 4 | 7.5% |
| Joven (18 a 29 años) | 16 | 30.2% |
| Adulto (30 a 59 años) | 12 | 22.6% |
| Adulto Mayor (≥ de 60 años) | 14 | 26.4% |
| **Clasificación según origen de la infección** | | |
| Autóctono | 52 | 98.1% |
| Importado | 1 | 1.9% |

**Gráfico N° 22: Frecuencia de casos confimados de leptospirosis. Hasta la semana epidemiológica 33-2026**




**Gráfico N° 23: Frecuencia de casos de leptospirosis confirmados. Hasta Agosto 2026**




**Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y**
**Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental – Hospital Regional "JAMO**
**Hasta la S.E 33 del 2026**

# OTRAS ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

**Tabla N° 03: Frecuencia de otras enfermedades notificadas sujetas a vigilancia epidemiológica, según casos confirmados, negativos, probables y sospechosos. Hasta la S.E 33 - 2026**

| TODAS LAS ENFERMEDADES | CONFIRMADO | NEGATIVO | PROBABLE | SOSPECHOSO | TOTAL NOTIFICADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| TUBERCULOSIS | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| SIFILIS NO ESPECIFICADA | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| TOS FERINA | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| OFIDISMO | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MUERTE MATERNA DIRECTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SARAMPION | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FIEBRE DE CHIKUNGUNYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIFILIS CONGENITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARALISIS FLACIDA AGUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIFILIS MATERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUERTE MATERNA INDIRECTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SINDROME DE GUILLAIN BARRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEPRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MALARIA POR P. VIVAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades MINSA**
**Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental – Hospital Regional "JAMO II-2 de Tumbes"**
**Hasta la S.E 33 del 2026**

# MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL

**Tabla N° 04: Características epidemiológicas de la mortalidad perinatal y neonatal en el Hospital Regional II-2 "JAMO". Hasta S.E. 33-2026**

| Características | n = 19 | % |
|---|---|---|
| **Tipo de Muerte** | | |
| Fetal | 11 | 57.9% |
| Neonatal | 8 | 42.1% |
| **Edad Gestacional *** | | |
| Media (± Desviación Estándar) | 33.26 | 4.76 |
| Mínimo (Máximo) | 23 Sem. | 39 Sem. |
| **Peso del Nacimiento *** | | |
| Media (± Desviación Estándar) | 2091.8 | 982.12 |
| Mínimo (Máximo) | 523 | 3,780 |
| **Sexo** | | |
| Masculino | 8 | 42.1% |
| Femenino | 11 | 57.9% |
| **Momento de Ocurrencia de la Muerte** | | |
| Ante-Parto | 11 | 57.9% |
| Intra-Parto | - | - |
| Post-Parto | 8 | 42.1% |
| **Lugar de la Muerte** | | |
| Establecimiento de Salud | 9 | 47.4% |
| Comunidad (Obito) | 10 | 52.6% |
| **Lugar de Atención de Parto** | | |
| Parto Institucional | 19 | 100% |
| Parto Domiciliario | - | - |

**Tabla N° 05: Características sociodemográficas y epidemiológicas de la mortalidad neonatal en el Hospital Regional II-2 "JAMO". Hasta S.E. 33-2026**

| Características | n = 8 | % |
|---|---|---|
| **Sexo** | | |
| Masculino | 3 | 37.5% |
| Femenino | 5 | 62.5% |
| **A término (≥ 37 SG)** | | |
| Menos de 1 día | - | - |
| De 1 a 7 días | 7 | 87.5% |
| De 8 a 28 días | 1 | 12.5% |
| **Clasificación del neonato por peso en gramos** | | |
| Extremadamente bajo peso al nacer (500-999 gr.) | 1 | 12.5% |
| Muy bajo peso al nacer (1000-1499 gr.) | 2 | 25.0% |
| Bajo peso al nacer (1500-2499 gr.) | 2 | 25.0% |
| Peso adecuado (2500-3999 gr.) | 3 | 37.5% |
| Macrosómico (4000 gr. a más) | - | - |
| **Distribución de muertes según edad gestacional** | | |
| Premarturo (≤ 36 SG) | 5 | 62.5% |
| A término (≥ 37 SG) | 3 | 37.5% |
| **Lugar de Atención de Parto** | | |
| Parto Institucional | 8 | 100% |
| Parto Domiciliario | - | - |

**(*) Presenta media, desviación estándar, mínimo y máximo**

**Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades MINSA**
**Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental – Hospital Regional "JAMO II-2 de Tumbes"**
**Hasta la S.E 33 del 2026**

# MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL

**Gráfico N° 24: Frecuencia de Mortalidad Neonatal, según causa de la muerte hasta la semana epidemiológica 33-2026**




**Gráfico N° 25: Frecuencia de Mortalidad Perinatal y Neonatal, según procedencia hasta la semana epidemiológica 33-2026**




**Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades MINSA**
**Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental – Hospital Regional "JAMO II-2 de Tumbes"**
**Hasta la S.E 33 del 2026**

# MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL

## Gráfico N° 26: Frecuencia de Mortalidad Perinatal y Neonatal, según años 2020-2025 y hasta S.E. 33-2026




## Gráfico N° 27: Frecuencia de la Mortalidad Neonatal, según años 2020-2025 y hasta S.E. 33-2026




Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades MINSA
Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental – Hospital Regional "JAMO II-2 de Tumbes"
Hasta la S.E 33 del 2026

# INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD - I.A.A.S

**Tabla N° 06: Tasas de densidad de incidencia e incidencia acumulada según tipo de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (I.A.A.S), riesgo y servicio hospitalario. Hasta Junio 2026.**

| Tipo de IAAS | Factor de Riesgo | Servicio Hospitalario | N° de I.A.A.S mensual | | | | | | | | | | | | N° de días de exposición y procedimientos acum. | Total I.A.A.S | Tasa Acumulada | Tasa Nacional II-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | | | | |
| Neumonía | Ventilación Mecánica | Neonatología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 142 | 0 | **0.00** | **3.01** |
| | | UCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | 414 | 1 | **2.42** | **6.94** |
| Infección del Tracto Urinario | Sonda Vesical | UCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 740 | 0 | **0.00** | **1.87** |
| | | Medicina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 794 | 0 | **0.00** | **1.06** |
| | | Cirugía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 458 | 0 | **0.00** | **0.65** |
| Infección del Torrente Sanguíneo | Catéter Venoso Central | Neonatología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 282 | 0 | **0.00** | **0.61** |
| | | UCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | 664 | 1 | **1.51** | **1.46** |
| | Nutrición Parenteral Total | Neonatología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | **0.00** | **0.00** |
| | | UCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 19 | 0 | **0.00** | **0.00** |
| | Catéter para Hemodiálisis | UCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 84 | 0 | **0.00** | **0.00** |
| | Catéter Venoso Periférico | Neonatología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 206 | 0 | **0.00** | **0.74** |
| Infección de Sitio Quirúrgico | Colecistectomía | Cirugía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 77 | 0 | **0.00** | **0.09** |
| | Hernioplastia Inguinal | Cirugía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 37 | 0 | **0.00** | **0.22** |
| | Prótesis de Cadera | Traumatología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 | 0 | **0.00** | **0.00** |
| | Parto Cesárea | Gineco-Obstetricia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | 596 | 1 | **0.17** | **0.72** |
| Endometritis | Parto Vaginal | Gineco-Obstetricia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 331 | 0 | **0.00** | **0.09** |
| | Parto Cesárea | Gineco-Obstetricia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | 596 | 3 | **0.50** | **0.10** |
| | | | **0** | **1** | **0** | **0** | **2** | **3** | | | | | | | | **6** | | |
| **Total general** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades MINSA**
**Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental – Hospital Regional "JAMO II-2 de Tumbes"**
**Hasta la S.E 33 del 2026**

# LESIONES POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO

**Tabla N° 07: Características sociodemográficas y epidemiológicas de los casos por Lesiones de Accidente de Tránsito. Hasta Julio 2026**

| Características | n = 409 | % |
|---|---|---|
| **Edad *** | | |
| Media (± Desviación Estándar) | 30.37 | 16.68 |
| Mínimo (Máximo) | 1 años | 91 años |
| **Sexo** | | |
| Masculino | 282 | 68.9% |
| Femenino | 127 | 31.1% |
| **Distribución por etapas de vida** | | |
| Niño (0 a 11 años) | 29 | 7.1% |
| Adolescente (12 a 17 años) | 42 | 10.3% |
| Joven (18 a 29 años) | 167 | 40.8% |
| Adulto (30 a 59 años) | 141 | 34.5% |
| Adulto Mayor (≥ de 60 años) | 30 | 7.3% |
| **Condición de egrero** | | |
| Alta | 390 | 95.4% |
| Retiro voluntario | - | - |
| Fallecido | 9 | - |
| Referido | 10 | - |

**Fuente1: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades MINSA**
**Fuente2: SOAT de la Oficina de Seguros Integral**
**Fuente3: Libro de Registros de la PNP que prestan servicio en Emergencia**
**Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental - Hospital Regional "JAMO II-2 de Tumbes"**







**Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades MINSA**
**Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental – Hospital Regional "JAMO II-2 de Tumbes"**
**Hasta la S.E 33 del 2026**

# LESIONES POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO

**Gráfico N° 29: Frecuencia de lesionados por accidente de tránsito, según años 2020 - 2026**




**Gráfico N° 30: Frecuencia de casos de lesionados por accidente de tránsito mensual, según meses del año 2025-2026**




**Gráfico N° 31: Porcentaje de lesionados por accidente de transito, según tipo de accidente. Hasta Julio 2026**




**Gráfico N° 32 Proporción de lesionados por accidente de transito, según vía donde ocurrio. Hasta Julio 2026**




Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades MINSA
Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental – Hospital Regional "JAMO II-2 de Tumbes"
Hasta la S.E 33 del 2026

# LESIONES POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO

**Gráfico N° 33: Proporción de lesionados por accidente de transito, según tipo de vehículo acasionante. Hasta Jul. 2026**




**Gráfico N° 34: Proporción de lesionados por accidente de transito, según traslado del lesionado. Hasta Jul. 2026**




**Gráfico N° 35: Proporción de lesionados por accidente de transito, según ubicación del lesionado. Hasta Jul. 2026**




**Tabla N° 08: Proporción de los casos por Lesiones de Accidente de Tránsito, según día de la semana y hora del día. Hasta Julio 2026**

| Día del accidente | Mañana | Tarde | Noche | Madrugada |
|---|---|---|---|---|
| Lunes | 9.7% | 17.6% | 19.0% | 26.7% |
| Martes | 12.4% | 8.0% | 18.3% | 8.9% |
| Miércoles | 16.8% | 8.0% | 7.9% | 4.4% |
| Jueves | 17.7% | 8.8% | 9.5% | 11.1% |
| Viernes | 15.0% | 16.0% | 12.7% | 4.4% |
| Sábado | 12.4% | 18.4% | 8.7% | 22.2% |
| Domingo | 15.9% | 23.2% | 23.8% | 22.2% |
| **Total** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |

**Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades MINSA**
**Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental – Hospital Regional "JAMO II-2 de Tumbes"**
**Hasta la S.E 33 del 2026**

# LESIONES POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO

**Gráfico N° 36: Proporción de accidente de transito, según condición del vehículo ocasionante. Hasta Jul. 2026**




**Gráfico N° 37: Proporción de pacientes lesionados por accidente de tránsito, según diagnóstico. Hasta Jul. 2026**




**Gráfico N° 38: Proporción de accidentes de tránsito, según procedencia del accidente. Hasta Jul. 2026**




**Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades MINSA**
**Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental – Hospital Regional "JAMO II-2 de Tumbes"**
**Hasta la S.E 33 del 2026**

# DIABETES

**Tabla N° 09: Características sociodemográficas y epidemiológicas de los casos de Diabetes. Hasta Julio 2026**

| Características | n = 151 | % |
|---|---|---|
| **Edad*** | | |
| Media (± Desviación Estándar) | 58.6 | 14.2 |
| Mínimo (Máximo) | 7 años | 98 años |
| **Sexo** | | |
| Femenino | 83 | 55.0% |
| Masculino | 68 | 45.0% |
| **Grado de instrucción** | | |
| Sin educación | 3 | 2.0% |
| Primaria | 143 | 94.7% |
| Secundaria | 5 | 3.3% |
| Superior | - | - |
| **Tipo de caso** | | |
| Prevalente | 143 | 94.7% |
| Incidente (nuevo) | 8 | 5.3% |

**(*) Presenta media, desviación estándar, mínimo y máximo**

**Tabla N° 10: Características clínicas y de tratamiento de los casos de Diabetes. Hasta Julio 2026**

| Características | n = 151 | % |
|---|---|---|
| **Tipo de diabetes** | | |
| Tipo II | 149 | 98.7% |
| Tipo I | 1 | 0.7% |
| Gestacional | 1 | 0.7% |
| **Peso*** | 69.95 | 15.87 |
| **Talla*** | 1.59 | 0.10 |
| **IMC*** | 27.72 | 5.67 |
| **Presión arterial sistólica*** | 122.11 | 25.71 |
| **Presión arterial diastólica*** | 73.14 | 11.57 |
| **Glicemia ayunas*** | 205.50 | 98.03 |
| **Estado del paciente** | | |
| Controlado | 35 | 23.2% |
| Descompensado | 116 | 76.8% |
| **Cumple el tratamiento** | | |
| Si | 40 | 26.5% |
| No | 103 | 68.2% |
| Iniciando el Tratamiento | 8 | 5.3% |
| **Recibió educación en Diabetes** | | |
| Si | 144 | 95.4% |
| No | 7 | 4.6% |

**(*) Presenta media y desviación estándar**

**Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades MINSA**
**Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental – Hospital Regional "JAMO II-2 de Tumbes"**
**Hasta la S.E 33 del 2026**

# DIABETES

## Gráfico N° 39: Frecuencia de casos en pacientes con diabetes, según año 2020 - 2025 y hasta Julio 2026




## Gráfico N° 40: Frecuencia de casos de diabetes, según meses. Enero - Julio 2026




## Gráfico N° 41: Distribución de casos de diabetes por grupo de edad y sexo. Hasta Julio 2026




## Gráfico N° 42: Proporción de uso de hipoglucemiantes en pacientes con diabetes. Hasta Julio 2026




**Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades MINSA**
**Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental – Hospital Regional "JAMO II-2 de Tumbes"**
**Hasta la S.E 33 del 2026**

# DIABETES

## Gráfico N° 43: Proporción de complicaciones en pacientes con Diabetes. Hasta Julio 2026




## Gráfico N° 44: Comorbilidades mas frecuentes en pacientes con diabetes. Hasta Julio 2026




## Gráfico N° 45: Proporción de casos de diabetes, según clasificación de Índice de Masa Corporal. Hasta Julio 2026




**Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades MINSA**
**Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental – Hospital Regional "JAMO II-2 de Tumbes"**
**Hasta la S.E 33 del 2026**

# DIABETES

**Gráfico N° 46: Proporción de los Niveles de presión sistólica y diastólica de los pacientes evaluados. Hasta Julio 2026**




**Gráfico N° 47: Proporción de casos de diabetes,según lugar de residencia. Hasta Julio 2026**




**Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades MINSA**
**Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental – Hospital Regional "JAMO II-2 de Tumbes"**
**Hasta la S.E 33 del 2026**

# MORBILIDAD MATERNA EXTREMA

**Tabla N° 11: Características sociodemográficas y epidemiológicas de los casos M.M.E. en el Hospital Regional II-2 "JAMO". Hasta Julio 2026**

| Características | n = 4 | % |
|---|---|---|
| **Edad *** | | |
| Media (± Desviación Estándar) | 29.50 | 9.85 |
| Mínimo (Máximo) | 20 años | 38 años |
| **Grupo de edad** | | |
| Menor de 21 años | 1 | 25.0% |
| De 21 a 35 años | 1 | 25.0% |
| Mayor a 35 años | 2 | 50.0% |
| **Estado Civil** | | |
| Conviviente | 3 | 75.0% |
| Casada | - | - |
| Soltera | 1 | 25.0% |
| **Condición de ingreso** | | |
| Gestante | 2 | 50.0% |
| Puérpera | 2 | 50.0% |
| **Vino referida de otro EE.SS** | | |
| Si | 1 | 25.0% |
| No | 3 | 75.0% |
| **Atención prenatal** | | |
| Si | 3 | 75.0% |
| No | 1 | 25.0% |
| **Días de hospitalización** | | |
| De 1 a 5 días | 2 | 50.0% |
| De 6 a 8 días | 1 | 25.0% |
| De 9 a 14 días | - | - |
| De 15 a 30 días | 1 | 25.0% |
| Mayor a 30 días | - | - |
| **Condición de egreso** | | |
| Alta | 2 | 50.0% |
| Referida | 1 | 25.0% |
| Fallecida | 1 | 25.0% |

| Año / Mes | Morbilidad Materna Extrema por meses | | | | | | | | | | | | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| **2023** | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | **21** |
| **2024** | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | **4** |
| **2025** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | **11** |
| **2026** | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | | **4** |

**Gráfico N° 48: Proporción de casos de M.M.E, según diagnóstico de ingreso. Hasta Julio 2026**




**Gráfico N° 49: Proporción de casos de M.M.E, según lugar de procedencia. Hasta Julio 2026**



# CÁNCER ENERO - JULIO 2026

**Total Casos**

**72**

| Distritos | Casos (+) |
|---|---|
| Tumbes | 43 |
| Zarumilla | 8 |
| Papayal | 4 |
| Pampas de Hospital | 4 |
| Aguas Verdes | 3 |
| Corrales | 3 |
| La Cruz | 2 |
| Zorritos | 2 |
| San Jacinto | 2 |
| San Juan de la Virgen | 1 |
| Canoas de Punta Sal | 0 |
| Matapalo | 0 |
| Casitas | 0 |




**Total Fallecidos**

**29**

| Distritos | Fallecidos |
|---|---|
| Tumbes | 16 |
| Zarumilla | 5 |
| Papayal | 2 |
| Aguas Verdes | 1 |
| Zorritos | 1 |
| San Juan de la Virgen | 1 |
| Corrales | 1 |
| Pampas de Hospital | 1 |
| San Jacinto | 1 |
| La Cruz | 0 |
| Casitas | 0 |
| Canoas de Punta Sal | 0 |
| Matapalo | 0 |

✓ Hasta Julio 2026 se notificaron según la fecha del 1er diagnóstico **72 casos de cáncer**, en el Hospital Regional "JAMO II-2 Tumbes", lo cual el distrito de Tumbes presenta la mayor proporción de casos con el **59.7%**. Por otro lado, el hospital presentó **29 casos de defunción** por esta causa, en pacientes atendidos en la fecha de su primer diagnóstico. Cabe señalar que en el presente año se notificó 33 defunciones por cáncer, en pacientes captados de diferentes fechas del año de su primer diagnóstico.

**Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades MINSA**
**Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental – Hospital Regional "JAMO II-2 de Tumbes"**
**Hasta la S.E 33 del 2026**

# CÁNCER

**Tabla N° 12: Características sociodemográficas y epidemiológicas de los casos de cáncer. Hasta Julio 2026**

| Características | n = 72 | % |
|---|---|---|
| **Edad *** | | |
| Media (± Desviación Estándar) | 61.56 | 15.07 |
| Mínimo (Máximo) | 8 años | 94 años |
| **Sexo** | | |
| Femenino | 43 | 59.7% |
| Masculino | 29 | 40.3% |
| **Tipo de seguro** | | |
| SIS | 69 | 95.8% |
| ESSALUD | 3 | 4.2% |
| FFAA/PNP | - | - |
| No asegurado | - | - |
| **Distribución por etapas de vida** | | |
| Niño (0 a 11 años) | 1 | 1.4% |
| Adolescente (12 a 17 años) | - | - |
| Joven (18 a 29 años) | 1 | 1.4% |
| Adulto (30 a 59 años) | 24 | 33.3% |
| Adulto Mayor (≥ de 60 años) | 46 | 63.9% |
| **Estadío clínico** | | |
| Estadio 0 | 30 | 41.7% |
| Estadio I | 1 | 1.4% |
| Estadio II | 1 | 1.4% |
| Estadio III | 2 | 2.8% |
| Estadio IV | 38 | 52.8% |

**Gráfico N° 50: Frecuencia de casos de cáncer, según año del primer diagnóstico 2019 - 2025, y hasta Julio 2026**




**Gráfico N° 51: Proporción de casos de cáncer, según tratamiento. Hasta Julio 2026**




**Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología, Preve**
**Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental – Hospital Regional**
**Hasta la S.E 33 del 2026**

# CÁNCER

## Gráfico N° 52: Proporción de los casos de cáncer, según localización topográfica. Hasta Julio 2026




## Gráfico N° 53: Proporción de casos de cáncer, según método del primer diágnóstico. Hasta Jul. 2026




## Gráfico N° 54: Proporción de casos de cáncer, según grado de diferenciación. Hasta Jul. 2026




## Gráfico N° 55: Proporción de casos de cáncer, según base del diágnóstico. Hasta Jul. 2026




**Fuente: Base de datos NOTIWEB - Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enferme**
**Elaborado: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental – Hospital Regional "JAMO II-2 de Tumbes"**
**Hasta la S.E 33 del 2026**

# VIH Y SIDA AÑO 2019 - 2026

## Gráfico N° 56: Frecuencia de casos VIH-SIDA, según año de diagnóstico 2019 - 2025. Hasta Julio 2026




## Gráfico N° 57: Proporción de casos de VIH, según nacionalidad año 2019 - 2025. Hasta Julio 2026




## Gráfico N° 58: Proporción de casos de VIH, según procedencia año 2019 - 2025. Hasta Julio 2026




**Tabla N° 13: Frecuencia de otros tipos de eventos notificados. Año 2019 - 2025. Hasta Julio 2026**

| Tipo de eventos | Años notificados | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Gestante con VIH | 2 | 7 | 6 | 17 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| Niño nacido expuesto al VIH | 3 | 7 | 3 | 15 | 4 | 11 | 8 | 1 |
| Niño nacido expuesto, no infectado VIH | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |